

UNIVERSITÄTSMEDIZIN GÖTTINGEN • GEORG-AUGUST-UNIVERSITÄT Klinik für Gastroenterologie, gastrointestinale Onkologie und Endokrinologie Direktor: Prof. Dr. V. Ellenrieder

Robert-Koch-Str. 40 • 37075 Göttingen • Tel: 0551/39-63345

Patienteninformation vor ambulanter Endoskopie

Seite 1/2

Liebe Patientin, lieber Patient,

bei Ihnen ist am _____ um 08:00 / 08:30 / 09:00 Uhr eine endoskopische Untersuchung in unserer Klinik geplant. Nachfolgend möchten wir Ihnen hierzu wichtige Hinweise geben. Am Untersuchungstag melden Sie sich bitte 15 Minuten vorher (also 07:45 / 08:15 / 08:45 Uhr) an der Leitstelle Innere Medizin (Ebene 3, Fahrstuhl B3) an. Bringen Sie hierzu einen Überweisungsschein und Ihre Krankenversichertenkarte mit. Anschließend begeben Sie sich zur Endoskopie, welcher sich auf gleicher Ebene zwischen den Fluren 6 und 8 (auf Höhe der Leitstelle B2) befindet.

Bitte kümmern Sie sich rechtzeitig um eine Begleitperson, die Sie nach der Untersuchung nach Hause bringt, sowie um eine Betreuung zu Hause.

Vor Untersuchungsbeginn müssen Sie Ihre Kleidung ablegen und ein von uns zur Verfügung gestelltes Untersuchungshemd anziehen. Hierfür ist genügend Zeit eingeplant. Um Verlust oder Diebstahl zu vermeiden, bitten wir Sie, am Untersuchungstag <u>auf das Tragen von nicht zwingend erforderlichen Schmuckgegenständen</u> (z.B. Ketten, Ringe, Uhren etc.) zu verzichten. Leider gibt es in den Räumlichkeiten unserer Endoskopie keine Möglichkeit, Ihre Kleidungsstücke zu verstauen. Hierdurch kann Verlust sowie unbeabsichtigte Beschmutzung / Beschädigung vorgebeugt werden.

Wir bitten Sie daher am Tag der Untersuchung UNBEDINGT eine Tasche, einen Rucksack, einen Beutel oder sonstige Aufbewahrungsmöglichkeit für Ihre Kleidungsstücke mitzubringen!

Essen ist bei allen Untersuchungen mit Ausnahme der Koloskopie bis zum Abend vor der Untersuchung erlaubt. Trinken von klaren Flüssigkeiten ohne Kohlensäure ist bis 2 Stunden vor der Untersuchung gestattet (Kaffee nur ohne Milch). Ihre Medikamente dürfen Sie mit einem Schluck Wasser am Morgen der Untersuchung bis 6:30 Uhr einnehmen, sofern nicht anders verordnet. Die weitere Vorbereitung ist abhängig von der bei Ihnen geplanten Untersuchung. In Abhängigkeit der erfolgten Untersuchung ist nach vollständigem Aufwachen aus der Narkose das Essen und Trinken wieder erlaubt.

Sollte bei Ihnen eine Narkose erfolgt sein, dürfen Sie bis zum Morgen des Folgetages nach der Untersuchung <u>nicht</u> aktiv am Straßenverkehr teilnehmen, insbesondere keine Fahrzeuge (auch Fahrräder und eScooter) führen, keine Maschinen bedienen, nicht in großer Höhe arbeiten, keine schweren körperlichen Arbeiten verrichten, keinen Alkohol trinken und keine wichtigen und/oder rechtlich bindenden Entscheidungen treffen.

Sie werden bei einer erfolgten Narkose nach der Untersuchung in einen Aufwachbereich gebracht, wo Sie sich ausruhen können. Dort werden Sie so lange überwacht, bis Sie wieder vollständig wach sind, jedoch <u>mindestens eine Stunde</u>.



UNIVERSITÄTSMEDIZIN GÖTTINGEN • GEORG-AUGUST-UNIVERSITÄT Klinik für Gastroenterologie, gastrointestinale Onkologie und Endokrinologie

Direktor: Prof. Dr. V. Ellenrieder Robert-Koch-Str. 40 • 37075 Göttingen • Tel: 0551/39-63345

Patientenintomation vor ambulanter Endoskopie

Seite 2/2

Geplante Untersuchungen und Besonderheiten:

-	
■ Magenspiegelung (Gastroskopie) Sie müssen nüchtern sein.	
☐ Endoskopische Ultraschallunters Sie müssen nüchtern sein.	uchung (Endosonographie)
☐ Endoskopische Gallengangsdars Sie müssen nüchtern sein.	tellung (ERCP)
	vor der Untersuchung. Dies kann in Abhängigkeit von der er Untersuchung erfolgen. Bei gewünschter oder notwendiger
Himbeeren, <u>keine</u> Tomaten Vorbereitung mit Moviprep inl Bitte beachten Sie die Hinweise de Vortag der Untersuchung: Beginn Darmspülung ab	
Am Untersuchungstag:	r (Beutel A+B) und mindestens 1 Liter klare Flüssigkeit n Vortag

- Vortag der Untersuchung:
 - Beginn Darmspülung am Mittag mit Moviprep 1 Liter (Beutel A+B) und mindestens 2 Liter klare Flüssigkeit (Wasser, Tee, Kaffee ohne Milch, klare Fruchtsäfte ohne Fruchtfleisch)
 - Erneutes Trinken von Moviprep abends gegen 18 Uhr und mindestens 1 Liter klare Flüssigkeit (Wasser, Tee, Kaffee ohne Milch, klare Fruchtsäfte ohne Fruchtfleisch)